# Мезим® форте

Mezym® forte

#### Инструкция по применению. Противопоказания и форма выпуска.

Форма выпуска:

таб., покр. оболочкой: 20, 40, 80 или 100 шт.

Производитель: БЕРЛИН-ФАРМА ЗАО (Россия)

Действующее вещество: Панкреатин (Pancreatin)

## Форма выпуска, состав и упаковка

**Таблетки, покрытые оболочкой** розового цвета, плоскоцилиндрические, с почти плоскопараллельными поверхностями и скошенными кромками, с характерным запахом панкреатина.

	1 таб.
панкреатин* с минимальной:	
липолитической активностью	3500 ЕД Ph.Eur.
амилолитической активностью	4200 ЕД Ph.Eur.
общей протеолитической активностью	250 ЕД Ph.Eur.

<sup>\*</sup> получают из поджелудочных желез свиных.

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия карбоксиметилкрахмал (тип A), кремния диоксид коллоидный, магния стеарат. Состав оболочки: тальк, гипромеллоза, азорубиновый лак (Е122), симетикон эмульсия 30% (сухая масса), полиакрилат дисперсия 30% (сухая масса), титана диоксид (Е171), макрогол 6000.

20 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

20 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

# Фармакологическое действие

Препарат компенсирует недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

Входящие в состав панкреатина ферменты липаза, амилаза и протеаза облегчают переваривание жиров, углеводов и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике.

#### Показания

- недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, (хронический панкреатит, муковисцидоз);
- хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Состояния после резекции или облучения этих органов, сопровождающиеся нарушениями переваривания нищи, метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии);
- для улучшения переваривания пиши у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании;
- подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.

# Режим дозирования

Доза определяется индивидуально в зависимости от степени нарушения пищеварения.

**Взрослым:** по 1-2 таб. перед едой, не разжевывая и запивая водой. При необходимости дополнительно во время еды принимают еще 1-4 таб.

У детей препарат применяют по назначению врача.

Продолжительность лечения может варьироваться от нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной заместительной терапии).

# Побочное действие

Аллергические реакции, диарея или запор, тошнота, дискомфорт в эпигастральной области. При длительном применении в высоких дозах возможно развитие гиперурикозурии, повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови.

В единичных случаях у больных, страдающих муковисцидозом, наблюдается образование стриктур в илеоцекальной области после приема высоких доз.

# Противопоказания к применению

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- острый панкреатит;
- обострение хронического панкреатита.

Перед применением лекарства рекомендуем проконсультироваться с врачом онлайн

# Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения панкреатина при беременности изучена недостаточно. Применение возможно в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для

плода.

Перед применением лекарства рекомендуем проконсультироваться с врачом онлайн

## Применение у детей

У детей препарат применяют по назначению врача.

# Лекарственное взаимодействие

При одновременном применении панкреатина с препаратами железа возможно снижение всасывания последних.

Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальций карбонат и/или магния гидроксид, может привести к снижению эффективности панкреатина.

### Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30°C. Срок годности - 3 года.

Не применять после истечения срока годности.

# Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Приведенная научная информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.