Аллохол

Allochol

Инструкция по применению. Противопоказания и форма выпуска.
Форма выпуска: таб., покр. оболочкой: 50, 1000, 2000, 5000 или 10000 шт.

Производитель: ВИФИТЕХ ЗАО (Россия)

Форма выпуска, состав и упаковка

Таблетки, покрытые оболочкой белого цвета, круглые, двояковыпуклые.

	1 таб.
активированный уголь	25 мг
желчь сухая	80 мг
экстракт чеснока	40 мг
густой экстракт крапивы	5 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая 0.05685 г, тальк 0.0021 г, кальция стеарат 0.00105 г.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (100) - коробки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (200) - ящики картонные.
1000 шт. - пакеты (5) - ящики картонные (in bulk).
1000 шт. - пакеты (10) - ящики картонные (in bulk).

Фармакологическое действие

Желчегонное (холекинетическое и холеретическое) средство, снижает процессы гниения и брожения в кишечнике.
Усиливает секреторную функцию клеток печени, рефлекторно повышает секреторную и двигательную активность органов ЖКТ.

Показания

— хронический реактивный гепатит;
— холангит;
— холецистит;
— дискинезия желчевыводящих путей;
— атонические запоры;
— постхолецистэктомический синдром.

Режим дозирования

Внутрь, после еды, по 1-2 таб. 3-4 раза/сут в течение 3-4 нед; при обострении - по 1 таб. 2-3 раза/сут в течение 1-2 мес.
Повторные курсы проводят с интервалом в 3 мес.

Побочное действие

Диарея, аллергические реакции.

Противопоказания к применению

— гиперчувствительность;
— калькулезный холецистит;
— обтурационная желтуха;
— острый гепатит;
— острая и подострая дистрофия печени;
— язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
— острый панкреатит.
Перед применением лекарства рекомендуем проконсультироваться с врачом онлайн

Применение при нарушениях функции печени

Противопоказан при остром гепатите, острой и подострой дистрофии печени.

Представлено описание активных веществ лекарственного препарата. Приведенная научная информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.